






Nældens takvinge



Mirabelblomst




Dagpåfugleøj




Citronsommerfugl



Ramsøg i blomst



Landsvale



Aurora



Mælkebøtte i frø



Pindsvin



Bøgen springer ud




Gæslinger fra grågås



Hyldeblomst




Hvid anemone i blomst



Mursejler



Hestekastanje i blomst




Guldsmede og vandnymfer



Skallet stilkporesvamp



Engkarse i blomst



Knopsvaneunge

FIND FORÅRET

20 forårstegn

I Find Foråret skal vi undersøge, hvor og hvornår 20 forskellige forårstegn viser sig i naturen. Hvornår ser du årets første:

Hvid anemone i blomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra februar til april.

Bøgen springer ud

De første bagefter kan typisk findes fra slutningen af marts.

Skallet stilkporesvamp

Skallet stilkporesvamp kan typisk findes fra slutningen af april.

Mirabelblomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra februar til april.

Pindsvin

Beholdt typisk af pindsvin. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Mælkebøtte i frø

Skallet stilkporesvamp kan typisk findes fra slutningen af april.

Citronsommerfugl

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Gæslinger fra grågås

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Engkarse i blomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af april.

Dagpåfugleøj

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Aurora

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Hyldeblomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af april.

Nældens takvinge

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Landsvale

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Hestekastanje i blomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af april.

Ramsøg i blomst

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Guldsmede og vandnymfer

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af marts.

Knopsvaneunge

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af april.

Mursejler

Op til 10 mm høje. Kan typisk findes fra slutningen af april.

Støttet af



15. Juni Fonden

DANSKE
NATURHISTORISKE
MUSEER

Hent app'en fra Arter og gå på opdagelse i foråret.



ARTER



Læs mere på:



www.findforaret.dk